


遺伝性痙性対麻痺の運動障害の見直し (2017.8)



横地健治

1



2

1



3



・共同運動 ・股膝屈曲と足底屈

分離運動制限
股屈曲過活動

4

2



9y11m

乳児期発症

股内旋屈曲・膝屈曲
交互性骨盤回旋
体幹前傾
肩振り
手は後方



分離運動制限
股屈曲過活動

5



1歳代発症



股内旋屈曲・膝屈曲 交互性骨盤回旋 肩振り

分離運動制限
股屈曲過活動

6

3

6歳発症



共同運動
股膝屈曲
骨盤前出し

分離運動制限
股屈曲過活動
股伸展荷重制限

7

ALS2



7y11m

交互性骨盤回旋
肩振り

分離運動制限
股屈曲過活動

8

4

1y頃発症 NFU1変異



股屈曲・弱外旋 膝弱屈曲 共同運動



3y3m

分離運動制限
股屈曲過活動
股伸展荷重制限

9



大股歩行



足出ず




足出る



分離運動制限
股屈曲過活動
股伸展荷重制限

10

5



11

4y0m



股膝屈曲 足底屈
交互性骨盤回旋
肩振り

分離運動制限
股屈曲過活動
伸展荷重制限
大脳白質性共収縮制御障害

後天発症の痙性対麻痺にも発達期脳性運動症候は適用できる

12